

AVERTISSEMENTS **GRICOLES** téléimprimés EDITION GRANDES CULTURES

STATION
POITOU-CHARENTES



Bulletin n° 298 (18/95) 27/07/1995

MAIS : sésamie, intervention 2ème génération dans certaines situations

MAIS : stade 7-8.

SESAMIE

Situation - Préconisation

Le vol de 2ème génération a débuté du 20 au 25 juillet pour certains postes.

Dans les zones à risque élevé et à risque faible (Avertel page 64) une intervention est nécessaire dans certains cas :

- sur maïs doux et maïs sésamie ;
- sur maïs semé en dérobée ;
- lorsque le taux d'attaque dépasse 5 % de pieds touchés en maïs consommation.

Dans ces situations le traitement devra être effectué du 7 au 12 août avec un produit homologué à pleine dose en un seul passage.

Aucune intervention n'est justifiée dans les autres situations.

PYRALE

Situation-Préconisation

Le vol de 1ère génération a été particulièrement long avec des captures jusqu'à la mi-juillet (voire au-delà pour quelques postes).

Les derniers traitements ont dû être réalisés vers les 10-13 juillet.

PUCERONS

Situation - Préconisation

Les populations sont restées faibles. Pas d'intervention.

TOURNESOL : stade début à fin floraison.

PHOMOPSIS

Situation

Des projections significatives de spores ont été observées du 11 au 17 juillet selon les secteurs. Les risques de contaminations et d'évolution rapide de la maladie suite à ces projections sont faibles (moindre sensibilité de la culture à ce stade, période chaude et sèche).

Les symptômes sur feuilles liés aux contaminations de début juillet sont rares. Les conditions climatiques actuelles sont défavorables au passage de la maladie sur tige.

Préconisation

La lutte fongicide est terminée depuis fin juin-début juillet.

BnF
S&T

Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel: 350 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique

CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693

P22



DB 40 JS 40830